

機械学習の数理

正則化と一様大数の法則

楠岡成雄（東京大学名誉教授）

機械学習とは何か

目的、手法により多くの種類のものが存在

教師あり学習

教師なし学習

強化学習

第1次ブーム (1950年代～1970年頃) 人工知能の理論研究の始まり

第2次ブーム (1980年代) エキスパートシステム

第3次ブーム (2000年代～現在)

2015年～2017年 アルファ碁 (強化学習によるもの)

人間より強いプログラム 必勝法が見つかったわけではない

強化学習

近年、ファイナンスの世界でも注目されている
理論研究

- (1) ポートフォリオ最適化
- (2) 取引費用のある場合のデリバティブ価格

確率制御最適化問題

(1) はファンドの運用：うまくいけば理屈は問われない
機械学習（ブラックボックス）になじんでいる？

(2) は金融機関のリスク管理

機械学習の導いたものに対する説明責任

慎重に検討されており まだ実用段階ではない （らしい？）

教師あり学習

以下では主に、教師あり学習を例に考えていく

単純な数学的な定式化は難しく、多様な定式化が必要

この講演では次の例を念頭に考えていく

例「犬猫判定問題」

カラー写真データから写っているものが犬か猫かを判定する

画素数を \tilde{d} とする 各画素の 赤、緑、青、3色

それぞれの明度を b ($0 \leq b \leq 1$) とすると

すべての画像データは $[0, 1]^d$ の元として表現される ($d = 3\tilde{d}$)

犬は 0 猫は 1 を返す 真の判定関数を f_0 とする

$f_0 : [0, 1]^d \rightarrow \{0, 1\}$ を見つけることが目的

それを「良く」模倣する関数を見つけない

教師あり学習

過去（既知）のデータ（訓練データ） $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, が与

$(x_k \in [0, 1]^d, y_k \in \{0, 1\}, k = 1, \dots, n)$

$y_k = f_0(x_k), k = 1, \dots, n.$

$f (f : [0, 1]^d \rightarrow \{0, 1\})$ を模倣する関数の候補とする

模倣の精度を測るもの

損失関数（誤差関数） $L(y, y')$ $y, y' \in \{0, 1\}$ を与え

$$L(f(x), f_0(x))$$

を小さくしたい

L の満たすべき性質

$$L(y, y) = 0, y \in \{0, 1\}, \quad L(y', y) > 0, y \neq y', y, y' \in \{0, 1\}$$

話の一般化

d 次元ベクトル x に対して実数値 y を返す真の関数 $y = f_0(x)$ がある

さらに n 個の $x_k \in \mathbf{R}^d$ に対しては

$y_k = f_0(x_k)$, $k = 1, \dots, n$, がわかっている

$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ が訓練データ

f_0 を模倣する関数 f をどのように探すか

ただし、模倣の精度を測る損失関数 $L(y, y')$, $y, y' \in \mathbf{R}$,

が与えられている

$$L(y, y) = 0, \quad y \in \mathbf{R},$$

$$L(y', y) > 0, \quad y \neq y' \quad y, y' \in \mathbf{R}$$

なぜ模倣関数を見つけようとするのか？

将来新たなデータ $x' \in \mathbf{R}^d$ が与えられたとき $f_0(x')$ を予測するため

もし過去データと将来データに何の関係もない

⇒ 学習は無意味

仮設 過去データと将来データに何らかの関係がある

統計学的な関連づけ

過去データと将来データに何らかの統計的な関係がある

[仮設] データはすべて独立同分布を持つ確率変数の実現値

非統計学的な関連づけもあり得る（現在まで考察されていない？）

[仮設] の下では統計的推定の手法を用いることが多い

以下 [仮設] の下で考える

[モデル]

パラメータ空間 $\Theta \subset \mathbf{R}^m$

パラメータ付き関数 $F : \mathbf{R}^d \times \Theta \rightarrow \mathbf{R}$ を適当に定める

(i) θ について線形なモデル

m 個の関数 $g_i, i = 1, \dots, m, (g_i : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R})$ を用意し

$$F(x, \theta) = \sum_{i=1}^m \theta_i g_i(x)$$

機械学習での例: カーネル法

(ii) θ について非線形なモデル

代表例: ニューラルネットワーク (後に述べる)

モデルの選択: 機械学習において最も重要

ここが人間の腕の見せ所!?

(統計的推定との類似)

良いパラメータ $\theta_0 \in \Theta$ を見つけて $\tilde{f} = F(\cdot, \theta_0)$ とする

問題点

(I) モデル $F : \mathbf{R}^d \times \Theta \rightarrow \mathbf{R}$ は適切か

モデル $F : \mathbf{R}^d \times \Theta \rightarrow \mathbf{R}$ を定めた時

(II) どのパラメータ $\hat{\theta} \in \Theta$ が「良い」のか

(III) 「良い」パラメータ $\hat{\theta} \in \Theta$ を学習データからどう見つけるのか

問題点 (I), (II), (III) は相互に関連している

損失関数 $L : \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \rightarrow [0, \infty]$ の選び方にも関連する

今日は (I) の問題は扱わない

X : データとなるベクトル値 (\mathbf{R}^d -値) 確率変数

$$L_0(\theta) = E[L(F(X, \theta), f_0(X))]$$

を最小にする $\theta_0 \in \Theta$ を求めたい。

しかし、 $L_0(\theta)$ は未知

実際に行われる (行える) こと

過去データ $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ が与えられた時

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n L(F(x_k, \theta), y_k)$$

を最小にする $\hat{\theta} \in \Theta$ を求める

問題あり!

線型モデル

$$F(x, \theta) = \sum_{i=1}^m \theta_i g_i(x)$$

$$\sum_{i=1}^m \theta_i g_i(x_k) = F(x_k, \theta) = y_k, \quad k = 1, \dots, n$$

θ の一次方程式

$m > n$ ならば解は存在しないか 無数に存在するかのどちらか

従来の統計学では $m \ll n$ とせよ (AIC)

機械学習では $m \gg n$ にとることが多い

過剰適合 (Overfitting) 過学習 (Overlearning)

過剰適合を回避するためのアイデア 正則化 (regularization)

「正則化関数」 $\phi : \Theta \rightarrow [0, \infty)$ を一つ定める

$\lambda > 0$ に対して

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n L(F(x_k, \theta), y_k) + \lambda \phi(\theta)$$

を最小にする $\hat{\theta}_\lambda \in \Theta$ を求める

正則化関数の例

(L^1 正則化) $\phi(\theta) = \sum_{i=1}^m |\theta_i|$

(L^2 正則化) $\phi(\theta) = \left(\sum_{i=1}^m |\theta_i|^2 \right)^{1/2}, \phi(\theta) = \sum_{i=1}^m |\theta_i|^2$

正則化の意味は過剰適合を避けるだけか？

$$L_0(\theta) = E[L(F(X, \theta), f_0(X))]$$

を最小にする $\theta = \theta_0$ が良いパラメータ

$X_k, k = 1, \dots,$ が独立で分布が ν であるならば

$$\hat{L}_n(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n L(F(X_k, \theta), f_0(X_k))$$

は n が大きければ $L_0(\theta)$ に近いはず (大数の法則)

$\hat{L}_n(\theta)$ の最小を求めるのは何故だめなのか

θ を動かすので、 $|\hat{L}_n(\theta) - L_0(\theta)|$ が「一様」に小さい必要がある

「一様大数の法則」

一様大数の法則のための重要な道具：Radmacher 複雑度

$$n \geq 1$$

\mathbf{R}^d 上の分布 ν

\mathbf{R}^d 上の関数の族 \mathcal{K}

($g \in \mathcal{K}$ は \mathbf{R}^d 上の関数 $g : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$)

Radmacher 複雑度

$$\mathcal{R}_n(\mathcal{K}; \nu)$$

が定まる

Radmacher 複雑度の定義

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_n(\mathcal{K}; \nu) \\ = E\left[\sup_{g \in \mathcal{K}} \sum_{k=1}^n g(X_k) \sigma_k\right] \end{aligned}$$

ただし、 $\sigma_1, \dots, \sigma_n, X_1, \dots, X_n$ は独立確率変数、
 $\sigma_k, k = 1, \dots, n$, は $\{-1, 1\}$ -値

$$P(\sigma_k = 1) = P(\sigma_k = -1) = \frac{1}{2}$$

$X_k, k = 1, \dots, n$, は \mathbf{R}^d -値確率変数でその分布は ν

Radmacher 複雑度の性質

金森敬文「統計的学習理論」 講談社

MLP 機械学習プロフェッショナルシリーズ

\mathbf{R}^d 上の分布 ν , \mathbf{R}^d 上の関数の族 \mathcal{K}

$\rho(s, x)$ $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 上の関数

Lipschitz 連続性 $|\rho(s, x) - \rho(t, x)| \leq |s - t|$, $s, t \in \mathbf{R}$, $x \in \mathbf{R}^d$, とする

\mathbf{R}^d 上の関数の族 \mathcal{K}' を

$$\mathcal{K}' = \{\rho(g(x), x); g \in \mathcal{K}\}$$

で定めると

$$\mathcal{R}_n(\mathcal{K}'; \nu) \leq \mathcal{R}_n(\mathcal{K}; \nu) \quad \text{Talagrand の定理}$$

一様大数の法則との関係

$X, X_k, k = 1, \dots,$ が独立で分布が ν であるならば

$$E\left[\sup_{g \in \mathcal{K}} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(X_k) - E[g(X)] \right)\right] \leq 2\mathcal{R}_n(\mathcal{K}; \nu)$$

$$E\left[\inf_{g \in \mathcal{K}} \left(E[g(X)] - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(X_k) \right)\right] \leq 2\mathcal{R}_n(\mathcal{K}; \nu)$$

が成立する

これが一様大数の法則というわけではない

(仮定 1) ある $\ell_0 > 0$ が存在して $0 \leq L(y, y') \leq \ell_0, y, y' \in \mathbf{R}$

(仮定 1) の下では、個々の θ に対しては $1 - 2 \exp(-\frac{d_0^2}{2\ell_0^2})$ の確率で

$$|\hat{L}_n(\theta) - L_0(\theta)| \leq \frac{d_0}{\sqrt{n}} \quad (\text{小偏差原理})$$

一様大数の法則の応用

$\phi_0(\theta)$ 正則化関数の種 $\phi_0 : \Theta \rightarrow [0, \infty)$

$r \geq 1$ に対して

$$\mathcal{K}_r = \{L(F(\cdot, \theta), f_0(\cdot)); \phi_0(\theta) \leq r\}$$

とおく

\mathcal{K}_r は関数 $x \rightarrow L(F(x, \theta), f_0(x)), \phi_0(\theta) \leq r$, の族

以下を仮定する

(仮定 2) $C_0 > 0, \alpha \geq 1$ が存在して

$$\mathcal{R}_n(\mathcal{K}_r; \nu) \leq \frac{C_0 r^\alpha}{\sqrt{n}}, \quad r \geq 1, n = 1, 2, \dots$$

(仮定 1)、(仮定 2) の下で以下が成立する

$d_0 \geq \ell_0$ ならば $1 - 2 \exp(-\frac{d_0^2}{2\ell_0})$ の確率ですべての $\theta \in \Theta$ に対して

$$|\hat{L}_n(\theta) - L_0(\theta)| \leq \frac{d_0}{\sqrt{n}} (1 + \phi_0(\theta))^{1/2} + \frac{C_0}{\sqrt{n}} (1 + \phi_0(\theta))^\alpha$$

正規化関数 ϕ ($\phi : \Theta \rightarrow [0, \infty)$)

$\theta_0 \in \Theta : L_0(\theta)$ の最小点 (その中で $\phi(\theta)$ を最小にするもの)

$\hat{\theta}_\lambda \in \Theta, \lambda > 0, \hat{L}_n(\theta) + \lambda\phi(\theta)$ の最小点

$$L_0(\theta_0) \leq L_0(\hat{\theta}_\lambda),$$

$$\hat{L}_n(\hat{\theta}_\lambda) + \lambda\phi(\hat{\theta}_\lambda) \leq \hat{L}_n(\theta_0) + \lambda\phi(\theta_0)$$

$1 - 4 \exp(-\frac{d_0^2}{2\ell_0})$ の確率で

$$L_0(\hat{\theta}_\lambda) - L_0(\theta_0)$$

$$\leq \frac{d_0}{\sqrt{n}} + \lambda\phi(\theta_0)$$

$$+ \frac{d_0}{\sqrt{n}} (1 + \phi_0(\hat{\theta}_\lambda))^{1/2} + \frac{C_0}{\sqrt{n}} (1 + \phi_0(\hat{\theta}_\lambda))^\alpha - \lambda\phi(\hat{\theta}_\lambda)$$

$\hat{\theta}_\lambda$ が θ_0 に近いことは諦める

$L_0(\hat{\theta}_\lambda) - L_0(\theta_0)$ が小さければ良い

正則化関数 $\phi, \lambda > 0$ をどうとすべきか。

$\phi(\theta) = \phi_0(\theta)^\beta, \beta > 0$ とおく。

$\phi_0(\theta_0)$ がきわめて大きい場合： $\beta > 0$ をどうとってもだめ

$\beta = \alpha$ ととると

$$\lambda > \frac{C_0}{\sqrt{n}}$$

であれば良い？

$$\lambda \rightarrow \phi_0(\hat{\theta}_\lambda)$$

$$\lambda \rightarrow \phi(\hat{\theta}_\lambda)$$

を見る必要がある

深層学習

順伝搬型ニューラルネットワーク (FNN : Forward neural network)

$\rho : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$: 活性化関数 (activation function)

活性化関数の例

(1) $\rho(u) = \max\{0, u\}$ (非有界、一次同次、Lipshitz 連続)

(2) $\rho(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}}$ (有界、Lipshitz 連続)

(3) $\rho(u) = \tanh(u)$ (有界、Lipshitz 連続)

(4) ($\rho(u) = 1_{[0, \infty)}(u)$) (有界、連続性無し)

もともとの NN は (4) を用いていたが、現在の機械学習では使われない

FNN のパラメータ

$m \geq 1$ を定める (層の数: 色々な流儀あり)

$$I_0 = d,$$

$I_1 \geq 1, I_2 \geq 1, \dots, I_m \geq 1$, を定め、

$$I_{m+1} = 1 \text{ とする}$$

パラメータ

$$\vec{a} = (\vec{a}^{(0)}, \vec{a}^{(1)}, \dots, \vec{a}^{(m)})$$

$$\vec{a}^{(k)} = \{a_{i,j}^{(k)}\}_{i=1,\dots,I_{k+1} \ j=1,\dots,I_{k+1}}, \quad k = 0, \dots, m+1,$$

\mathbf{R}^d 上の関数 $g_i^{(k)}$, $k = 0, 1, \dots, m$, $i = 1, \dots, I_{k+1}$ ($g_i^{(k)} : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$)

を以下のように帰納的に定める

$$g_i^{(0)}(x; \vec{a}) = \sum_{j=1, \dots, d} a_{i,j}^{(0)} x_j + a_{i,d+1}^{(0)} \quad \text{1 次関数}$$

$$g_i^{(k+1)}(x; \vec{a}) = \sum_{j=1, \dots, I_{k+1}} a_{i,j}^{(k+1)} \rho(g_j^{(k)}(x)) + a_{i, I_{k+1}+1}^{(k+1)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, m-1.$$

$g_1^{(m)}(x; \vec{a})$ が出力 : $F(x, \theta)$

$g_i^{(0)}$ は x_j の一次関数, $g_i^{(k+1)}$ は $\rho(g_j^{(k)}(x))$ の一次結合

パラメータの次元 $\sum_{k=0}^m (I_k + 1) I_{k+1}$

実際のモデルではパラメータの次元はずっと小さい

多くの $a_{i,j}^{(\ell)} = 0$ とおくことが多い

また、 $a_{i,j}^{(\ell)} = a_{i',j'}^{(\ell')}$ とおいたりする (CNN)、

正則化

$$w_k(\vec{a}) = \max_{i=1, \dots, I_{k+1}} \sum_{j=1}^{I_k+1} |a_{i,j}^{(k)}|, \quad k = 0, 1, \dots, m,$$

$$\phi_0(\vec{a}) = 1 + |\rho(0)| + \sum_{k=0}^{m+1} w_k(\vec{a})$$

(仮定 3) $\ell_1 > 0$ が存在して $|L(y_1, y') - L(y_0, y')| \leq \ell_1 |y_1 - y_0|$,

(ν に対する若干の仮定の下で)

$$\mathcal{R}_n(\mathcal{K}_r, \nu) \leq \frac{\log(d+1)}{\sqrt{n}} 2^m \ell_1 r^{m+1}$$

$1 - 4 \exp(-\frac{d_0^2}{2\ell_0})$ の確率で

$$\begin{aligned}
L_0(\hat{a}_\lambda) - L_0(\vec{a}_0) &\leq \frac{d_0}{\sqrt{n}} + \lambda\phi(\vec{a}_0) \\
+ \frac{d_0}{\sqrt{n}}(1 + \phi_0(\hat{a}_\lambda))^{1/2} &+ \frac{\log(d+1)2^m\ell_0}{\sqrt{n}}(1 + \phi_0(\hat{a}_\lambda))^{m+1} \\
&- \lambda\phi(\hat{a}_\lambda)
\end{aligned}$$

$$\|\vec{a}\|_{L^1} = \sum_{k=0}^m \sum_{i=1}^{I_{k+1}} \sum_{j=1}^{I_k+1} |a_{i,j}^{(k)}|$$

$$\phi_0(\vec{a}) \leq 1 + |\rho(0)| + \|\vec{a}\|_{L^1}$$

$$\phi(\vec{a}) = \|\vec{a}\|_{L^1}, \quad \phi(\vec{a}) = \|\vec{a}\|_{L^1}^{m+1}$$